Uva della cascina

Vass7R12s556-560

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1158

Max to Japan Carding

Voa della Cascina 10 R8 s - 546-550







ANNEE 1991 NOM Alva della Cascuia EMPLACEMENT 10 Ry 8 1546-550 Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap Ferti-Floraison Véraison Souche lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Grappe : G - M - P Dim : 14 Compacité : L -Pour : O Mill : O Baie : TG - G - M - P Dim: 16 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré Saveur : S - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port: enge Vigueur: 35

ANNEE 1992

MOM

EMPLACEMENT NOR8 & 546-550

Moa della easena

<u>luntanimatr</u>inimatri

Souche Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison Maturité yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin 19.3 " , 193 2 Grappe : G - M - P Dim : 14 Compacité: L- M C 4 Mill : 2 — Pour : 1 > 1.1et 3 Baie: TG - G - M - P Dim: 49 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré 16 19.3 92 Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène

Port : luge a Vi

mi luge Vigueur : 4

ANNEE: 1993 NOM Uva della casaina EMPLACEMENT 10 R8 A-546.550

4t. 2.86 ni

301 Com												
Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb			Ferti-	Floraison début mi/f   fin			Véraison début mi/v fin		Maturité	
1 2	4	16.3	18.3.	112	3	28.5	31.5	3.6	3,8	9,8	17,8	6.9
3 4	H 3	16,3	N8.3-	0	Grappe Pour :		M - P	MASSING SERVICE	:	Compa	cité	: L - M-e
5	&			,	Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
	1	le 18	3.93		Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré  Saveur: s - m - ar - fox - herb							
					Pépins Port :							
						*						

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : 10 R 8. 0. 546-550 (0.1) Wa della cascina

ulandanilandanilandanilandanil

## (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182/- moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

## Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

## Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvorg

Voa della Cascina 10 R8 s. 546-550 s. 3

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 26 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 à raies 258 - vert 259. Noeuds

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264) - vert 265. Bourgeon

# (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvorg

Vva della cascina 10 R 8 9. 546-5504.3

dantadantadantadantad

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

## FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277, partiellement - totalement.

. Calvo89

# Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année: 1898
Code cépage: Uva della Cascina

Observateur : Lacombe

Emplacement: 10 R 80596.556

dantadantadantadantad

## Grappe

oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.
oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.
oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.
oiv 206 longueur pédoncule: très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.
oiv 207 lignification du pédoncule: base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7.
oiv 208\* forme: cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2
oiv 209\* présence d'un aileron: absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.

Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) (5) - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme (3.) oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 27- elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 ylindrique 7 - arquée 8. biv <u>225 couleur épiderme</u> : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir(6) oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniform(2) oiv 227 **pruine** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5)- forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3)- moyenne 5 - épaisse 7 - tres épaisse 9. oiv 229 **ombilic**: peu apparent 1 - apparent 2 oiv 230\* coloration de la pulpe : non colorée 1- colorée 2 oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée D- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2 oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 🖰 - élevée 7 - très élevée 9. oiv 236 saveur : aucune D- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5 oiv 236\* saveur : aucune D- goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4. oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) (5) long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5- difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3.) oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 6 mm oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (>10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9 oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes (1)- présentes 2

Vva della cascina 10 R80-546-550 p.2

nhootoodoodoodoodoodoodood

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

# SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : gréle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) 
duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 1.2.... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) . saillant (1) - effacé(2)

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvogo

N° d'ordre:
Désignation: Uva dellas Cascura
Emplacement: NORBA 546.550

Juntandanta

```
: (1)-2-3
Angle des nervures
                                      : 4 - 5 - 6
                                     : (7)-(8)- 9
L1/L
                                     : (10) - 11
L2/L
                                     : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                                     : 17 - 18 - 19 - 29
Prof. sinus latéral Sup.
                                     : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                     : 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                      : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
                                      : 271
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                      : 40 - 41
Dents : forme
                                      : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                      : 45 - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                     : 60 - 61 - 62
: 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Angle des nervures L3 L'3
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92